

இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2025

ශ්‍රේණිය Grade	12	විෂයය Subject	සංයුක්ත ගණිතය I	කාලය Time	පැය 2 මිනිත්තු 40
නම පெயர் Name					

(10) සංයුක්ත ගණිතය I		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
B	9	
	10	
	11	
	12	
එකතුව		

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක	
පරීක්ෂා කළේ	
1	
2	
අධීක්ෂණය කළේ	

1. $f(x) = \frac{2x}{3x-1}; x \neq \frac{1}{3}$ යනු එකට එක ශ්‍රිතයකි. එහි ප්‍රතිලෝම ශ්‍රිතය $f^{-1}(x)$ සොයා $f(x)$ හි පරාසය ද සොයන්න. $f^{-1}[2f(1)] = \frac{1}{2}$ බවද පෙන්වන්න.

2. $1 \leq \frac{3x}{x^2-4}$ අසමානතාව තෘප්ත කරන x හි අගය පරාසය සොයන්න.

3. $y = |x - 2|$ හා $y = k - 2|x + 1|$ ලෙස දී ඇත. මෙහි $k \in \mathbb{Z}^+$ වේ. $|x - 2| \leq k - 2|x + 1|$ අසමානතාව තෘප්ත කරන x හි අගයන් $x \in \left[\frac{-4}{3}, 0 \right]$ වන බව සලකමින් ඉහත ප්‍රස්ථාර එකම සටහනක ඇඳ දක්වා k හි අගය සොයන්න.

4. $P(x)$ යනු x හි බහුපද ශ්‍රිතයකි. $P(x)$ යන්න, $(x - 1)$ න් හා $(x - 2)$ න් බෙදූ විට ශේෂයන් පිළිවෙලින් 2 හා 1 බැගින් වේ. $P(x)$ බහු පදය, $x^2 - 3x + 2$ යන බහුපදයෙන් බෙදූවිට ලැබෙන ශේෂය සොයන්න.

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 3x - \cos 5x}{\sqrt{1+x^2} - \sqrt{1-x^2}}$ හි අගය සොයන්න.

7. $A(-1, 3)$ හා $B(5, k)$ යා කරන රේඛාව මත වූ $P(2, h)$ මගින් AB රේඛාව කිසියම් අනුපාතයකට බෙදෙයි. $AB = 10$ ක් වේ නම් k හි අගය සොයන්න. P මගින් AB බෙදන අනුපාතය සොයා h හි අගයද ලබා ගන්න.

8. $\sin x + \cos x = \sin \frac{5\pi}{12} + \cos \frac{5\pi}{12}$ සමීකරණය විසඳන්න.

Grade

12

විෂයය
Subject

සංයුක්ත ගණිතය I

B කොටස

9. a). $f(x) = -2x^2 + \lambda x + \mu$ යැයි ගනිමු.
 $f(x) = -2(x+h)^2 + k$ ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන්න. මෙහි λ, μ, h සහ k යනු තාත්වික නියත වේ.
 $y = f(x)$ ප්‍රස්ථාරයේ හැරුම් ලක්ෂ්‍යයෙහි ඛණ්ඩාංක $(3, 2)$ ලෙස දී ඇත්නම් λ හා μ හි අගයන් සොයන්න. λ හා μ හි මෙම අගයන් සඳහා y -අක්ෂය ඡේදන ලක්ෂ්‍ය, සමමිතික අක්ෂය හා හැරුම් ලක්ෂ්‍යය දක්වමින් $y = f(x)$ හි දළ සටහනක් අඳින්න.
ඒනයිත් $2x^2 - \lambda x - \mu = 0$ සමීකරණයේ මූල වල ස්වභාවය නිර්ණය කරන්න.
- $g(x) = 4 + f(x+1)$ යැයි ගනිමු. $y = g(x)$ හි ප්‍රස්ථාරයෙහි සමමිතික අක්ෂයෙහි සමීකරණය හා අවම අගය ලබා ගන්න.
 $y = g(x)$ ශ්‍රිතයේ දළ ප්‍රස්ථාරය ඇඳ දක්වන්න. ඒනයිත් $f(x+1) = 4$ සමීකරණයේ මූල වල ස්වභාවය නිර්ණය කරන්න.
- b). $(x+m+2)^2 + (x-m)^2 = 2$ මගින් ලබා දෙන වර්ගජ සමීකරණයේ සමීකරණයේ මූල තාත්වික වීම සඳහා m ට ගතහැකි උපරිම හා අවම අගයන් සොයන්න. මෙහි $m \in \mathbb{R}$ වේ.
- α හා β යනු ඉහත වර්ගජ සමීකරණයේ මූල නම්, $\alpha + \beta$ හා $\alpha \beta$ සඳහා සංගුණක ඇසුරෙන් ප්‍රකාශන ලියා දක්වන්න. m හි සියලු අගයන් සඳහා මෙම මූල ධන නොවන බව පෙන්වන්න.
තවද $|\alpha - \beta| = 2$ සමීකරණය තෘප්ත කරන m හි අගය සොයන්න.
 $(3\alpha + 2)$ හ $(3\alpha + 2)$ මූල වශයෙන් ඇති වර්ගජ සමීකරණය $x^2 + 2x + 9m^2 + 18m + 1 = 0$ බව පෙන්වන්න.
10. a). $k \in \mathbb{R}^+$ සඳහා $f(x) \equiv 2x^3 - 7x^2 + 8x - k$ ලෙස දී ඇත.
 $(2x - k)$ යන්න $f(x)$ හි සාධකයක් නම්, k හි අගයන් සොයන්න.
 $k = 3$ අගය ගන්නා විට $f(x)$ යන්න රේඛීය සාධකවල ගුණිතයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරන්න.
 $2x^3 - 7x^2 + 7x - 2 = 0$ සමීකරණයේ මූල අපෝහනය කරන්න.
- b). $3x + 2 \equiv A(x-1)^2 + B(x^2 - x) + Cx$ ලෙස පවතින A, B හා C තාත්වික නියත අගයන් සොයන්න.
ඒනයිත් $\frac{3x+2}{x(x-1)^2}$, පරිමේය ශ්‍රිතය පූර්ණ වශයෙන් හින්න භාග වලට වෙන්කර දක්වන්න.
තවද $\frac{3x+5}{x^2(x+1)}$ හි හින්න භාග අපෝහනය කරන්න.
- c). $y = 3|x-1|$ හා $y = |x| + |x-1|$ හි ප්‍රස්ථාර එකම සටහනක අඳින්න. ඒනයිත් $3|x-1| \leq y \leq |x| + |x-1|$ අසමානතාව තෘප්ත කරන පෙදෙසෙහි වර්ගඵලය සොයන්න.

11. a). (i) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin^2 x - \sin^2 a}{x - a} = \sin 2a$, බව පෙන්වන්න. $a \in \mathbb{R}$ වේ.

(ii) $x^2 - y + 7x - 6 = 0$ බව දී ඇත. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x-1} - \sqrt{y-2}}{\sqrt{x^2-1}}$ අගයන්න.

b). $x \in \mathbb{R}$ සඳහා $\frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$ ප්‍රකාශනයට ගත හැකි උපරිම හා අවම අගයන් සොයන්න.

c). $2^{x+3} - 8^{y+1} = 0$ හා $2 \log_9 x + \log_3 y = 3$ සමීකරණ සමගාමීව විසඳන්න.

d). OXY කාටිසියානු තලය අනුබද්ධයෙන් $A \equiv (3,0)$ හා $B \equiv (3,-2)$ ලෙස දී ඇත. දික් කරන ලද BA රේඛාව මත C ලක්ෂ්‍යය පිහිටා ඇත්තේ $BC:CA = 3:2$ වන පරිදිය. C හි ඛණ්ඩාංක සොයන්න.
 D යනු $(6,4)$ ඛණ්ඩාංක සහිත ලක්ෂ්‍යයකි. AC, AD හා CD පාද දිග ගණනය කරන්න.
 ADC කුමන වර්ගයේ ත්‍රිකෝණයක් ද යන්න අපෝහනය කරන්න.
 C ලක්ෂ්‍යය වෘත්තයෙහි පරිධිය මත පිහිටන පරිදි පවතින වෘත්තයක කේන්ද්‍රයේ ඛණ්ඩාංක ලබාගන්න.
තවදුරටත් $ACDE$ සෘජුකෝණාස්‍රයක් වන පරිදි E ලක්ෂ්‍යය වෘත්තයෙහි පරිධිය මත පිහිටයි නම්, E හි ඛණ්ඩාංක සොයන්න.

12. a). $\cos(A+B)$ සඳහා $\cos A, \sin A, \cos B$ හා $\sin B$ ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ලියා දක්වන්න.
 $\cos 5\theta$ සඳහා $\cos \theta$ ඇසුරෙන් ප්‍රකාශනයක් ලබාගන්න.

$\cos \theta \neq 0$ සඳහා $\frac{\cos 5\theta}{\cos \theta} = 16\cos^4 \theta - 20\cos^2 \theta + 5$, බව පෙන්වන්න.

ඒනයිත් $16x^2 - 20x + 5 = 0$ හි මූල $\cos^2 \frac{\pi}{10}$ හා $\cos^2 \frac{3\pi}{10}$ බව ද පෙන්වන්න.

තවද $\sec^2 \frac{\pi}{10} + \sec^2 \frac{3\pi}{10} = 4$ බව අපෝහනය කරන්න.

b). $f(x) = \frac{1}{2} \left[\sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + \sqrt{3} \right] + \cos x$ යැයි ගනිමු.

$f(x)$ යන්න $f(x) \equiv K [\sin(x + \alpha) + 1]$ ආකාරයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න.

$K > 0$ හා α ($0 < \alpha < \pi/2$) වන පරිදි K හා α නියත නිර්ණය කරන්න.

ඒනයිත්

(i). $f(x)$ සෘණ නොවන ශ්‍රිතයක් බව පෙන්වන්න.

(ii). $\frac{1}{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{6} \right) + \cos x = \frac{\sqrt{3}}{4}$ සමීකරණය විසඳන්න.


c). සුපුරුදු අංකනයෙන් ABC ත්‍රිකෝණයක් සඳහා සයින ප්‍රමේයය හා කෝසයින ප්‍රමේයය ප්‍රකාශ කරන්න.

$\cos \frac{A}{2} = \sqrt{\frac{\sin B + \sin C}{2 \sin C}}$ නම්, ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.

$a - b = \sqrt{2}c \sin \left(\frac{A-B}{2} \right)$ බවද පෙන්වන්න.

d). $2 \cos^{-1} x + \cos^{-1} 2x = \pi$ විසඳන්න.

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.” — Carl Rogers



Visit SLGURU.LK to download papers and notes.

දෙවන වාර ඇගයීම - 2025
Second Term Evaluation - 2025
இரண்டாம் தவணைப் பரீட்சை - 2025

ශ්‍රේණිය Grade	12	විෂයය Subject	සංයුක්ත ගණිතය II	කාලය Time	පැය 2 මිනිත්තු 40
නම පெயர் Name					

➤ මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ.
A කොටස (ප්‍රශ්න 1 – 8) සහ **B කොටස** (ප්‍රශ්න 09- 12)

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා ඔබේ පිළිතුරු සපයා ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.
වැඩිපුර ඉඩ අවශ්‍ය වේ නම් ඔබට අමතර ලියන කඩදාසි භාවිත කල හැකිය.

සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න. නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු “A” සහ “B” කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ “A” කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.

(10) සංයුක්ත ගණිතය II		
කොටස	ප්‍රශ්න අංක	ලැබූ ලකුණු
A	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
B	9	
	10	
	11	
	12	
එකතුව		

ඉලක්කමෙන්	
අකුරින්	

උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක	
පරීක්ෂා කළේ	
1	
2	
අධීක්ෂණය කළේ	

A කොටස

1. තිරස් රේල්පාරක $30ms^{-1}$ ඒකාකාර ප්‍රවේගයෙන් ගමන් කරන දුම්රියක්, A නම් ස්ථානය පසුකරනවාත් සමගම තිරිංග යොදන ලදී. දුම්රියෙහි වේගය $10ms^{-1}$ වන තෙක්ම $3\lambda ms^{-2}$ වන ඒකාකාර මන්දනයක් තිරිංග යෙදීම නිසා දුම්රියට ලැබී ඇත. පසුව එම ලබාගත්, ප්‍රවේගය ඒකාකාරව පවත්වා ගනිමින් කිසියම් දුරක් ගමන් කිරීමෙන් පසු, λms^{-2} ඒකාකාර ත්වරණයෙන් ගමන් කර, B නම් ස්ථානය පසු කරන මොහොතේ දී දුම්රියෙහි ප්‍රවේගය $30ms^{-1}$ වේ. A හා B අතර දුර $4km$ ද, A සිට B දක්වා චලිතයට ගත වූ කාලයේ මිනිත්තු 4ක් ද නම්, A සිට B දක්වා දුම්රියෙහි චලිතයට ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයක් ඇඳීමෙන් $\lambda = \frac{1}{6}$ බව පෙන්වන්න.


2. P නම් අංශුවක් O ලක්ෂ්‍යයක සිට λu ($\lambda > 1$) ප්‍රවේගයෙන් සිරස්ව ඉහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරන මොහොතේදීම, Q නම් තවත් අංශුවක් O සිට සිරස්ව h උසක් ඉහළින් වූ A ලක්ෂ්‍යයක සිට u ප්‍රවේගයෙන් සිරස්ව පහළට ප්‍රක්ෂේපණය කරනු ලැබේ. ප්‍රක්ෂේපණයෙන් t කාලයකට පසු P උපරිම උසට ළඟා වීමට ප්‍රථම Q සමඟ ගුවනේ ගැටේ නම්, $t = \frac{h}{(1+\lambda)u}$ බව පෙන්වන්න.

3. A, B, C හා D ලක්ෂ්‍ය හතරක පිහිටුම් දෛශික පිළිවෙලින් $\underline{a}, \underline{b}, 2(\underline{b} - \underline{a})$ හා $\frac{2\underline{b}}{3}$ වේ. A, D හා C ලක්ෂ්‍ය එක රේඛීය වන බව පෙන්වන්න. $AD:DC$ අනුපාතයද සොයා $OABC$ ත්‍රිකෝණයේ බවද පෙන්වන්න.


4. $\underline{a}$ හා $\underline{b}$ යනු $|\underline{a} + \underline{b}| = 2|\underline{a} - \underline{b}|$ හා $|\underline{a}| = 2|\underline{b}|$ යන නිෂ්ශුන්‍ය දෛශික දෙකකි. $\underline{a}$ හා $\underline{b}$ දෛශික අතර කෝණය $\cos^{-1} \frac{3}{4}$ බව පෙන්වන්න.

5. අංශුවක් මත එකිනෙකට θ ($0 < \theta < \frac{\pi}{2}$) කෝණයකින් ආනතව ක්‍රියා කරන නිෂ්ශූන්‍ය P හා Q බල දෙකක සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය $\frac{\sqrt{19}P}{2}$ වේ. බල දෙක අතර කෝණය දෙගුණ කළ විට ඒවයේ සම්ප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය $\frac{\sqrt{7}P}{2}$ වේ. $\frac{P}{Q}$ අනුපාතය θ ඇසුරින් සොයන්න. තවදුරටත් $\frac{P}{Q} = \frac{2}{3}$ බව දී ඇත්නම් $\theta = \frac{\pi}{3}$ බව අපෝහනය කරන්න.


6. O මූලය අනුබද්ධයෙන් $OABCDE$ යනු පාදයක දිග a වූ සවිධි ඡඩ්‍රයකි. OA පාදය x -අක්ෂයේ ධන දිශාව ඔස්සේ වේ. $2N$, λN හා $3N$ බල $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{AB}$ හා $\overrightarrow{OE}$ පාද ඔස්සේ ක්‍රියා කරයි. පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය $(-2a, 0)$ හරහා ගමන් කරයි නම් λ හි අගය සොයන්න. මෙම සම්ප්‍රයුක්තය $\overrightarrow{OE}$ බලයට සමාන්තර බව පෙන්වන්න.



7. අරය a වූ සෑම අතින්ම සර්වසම වූ බර w වූ සුමට ගෝල 2 ක් අරය $4a$ වූ සුමට කුහර ගෝලයක් තුළ සමමිතික ලෙස සමතුලිතතාවයේ පවතිනුයේ ගෝල දෙකෙහි කේන්ද්‍ර යා කරන රේඛාව තිරස් වන පරිදි වේ. ලාම් ප්‍රමේයය යොදා ගනිමින් සුමට ගෝල අතර ප්‍රතික්‍රියාව w ඇසුරෙන් සොයන්න.



8. දිග $6a$ හා බර $3w$ වූ ඒකාකාර AB දණ්ඩක A කෙළවර බිත්තියක් මත වූ අවල A ලක්ෂ්‍යයකට අසව් කර ඇත. A සිට x දුරකින් දණ්ඩ මත වූ C ලක්ෂ්‍යයේදී $2w$ භාරයක් එල්ලා ඇත. $AD = 4a$ වන පරිදි D ලක්ෂ්‍යයට හා A ට සිරස්ව ඉහලින් බිත්තිය මත වූ E ලක්ෂ්‍යයකට ගැට ගැසූ, තිරසර 30° ක් ආනත සැහැල්ලු අවිනන්‍ය තන්තුවක් මගින් AB තිරස්ව සමතුලිතව ඇත. A සන්ධියේ ප්‍රතික්‍රියාවේ සම්ප්‍රයුක්තය දණ්ඩ දිගේ පවතිනම් x හි අගය a ඇසුරින් සොයන්න.



- b). $\underline{a}$ හා $\underline{b}$ නිෂ්ශුන්‍ය දෛශිකයන් දෙකක තිත් ගුණිතය අර්ථ දක්වන්න.
 $\mu > 0$ හා $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ සඳහා $\underline{a} = 3\underline{i} + 4\underline{j}$ සහ $\underline{b} = \lambda\underline{i} + \mu\underline{j}$ ලෙස දී ඇත. මෙහි $\underline{i}$ හා $\underline{j}$ යනු OXY තලය අනුබද්ධයේ OX හා OY අක්ෂ ඔස්සේ වන ඒකක දෛශික වේ.
 $|\underline{b}| = 1$ හා $\underline{a}, \underline{b}$ එකිනෙකට ලම්භක දෛශික දෙකක්ද වන විට $\underline{b}$ දෛශිකය $\underline{i}$ හා $\underline{j}$ ඇසුරින් සොයන්න.
 $(\underline{a} + 5\underline{b})$ හා $(\underline{a} - 5\underline{b})$ දෛශික දෙක අතර කෝණයද සොයන්න.

11. a). $ABCD$ යනු $AB = 4a$ හා $BC = 3a$ වන සෘජුකෝණාස්‍රයකි. N යනු $AN = a$ වන පරිදි AB මත වූ ලක්ෂ්‍යයකි. එහි $\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}$ හා $\overrightarrow{NC}$ පාද ඔස්සේ පිළිවෙලින් නිව්ටන් 6, 5, 10, P, Q හා $2\sqrt{2}$ විශාලත්වයෙන් යුතුයි බලයන් ක්‍රියාකරයි.
 P හා Q හි කිසිදු අගයක් සඳහා මෙම බල පද්ධතිය සමතුලිත විය නොහැකි බව පෙන්වන්න.
 NC පාදය ඔස්සේ අක්ෂර වලින් දැක්වෙන දිශාවට වන තනි බලයකට මෙම බල පද්ධතිය තුල්‍ය වේ නම්, $Q = 1$ බව පෙන්වා P හි අගය ද ලබා ගන්න. මෙම තනි බලයේ විශාලත්වය ද සොයන්න.
මෙම පද්ධතිය සමතුලිත වන පරිදි, A ශීර්ෂය හරහා ක්‍රියාකරන විශාලත්වය F වන නව බලයක් ද, විශාලත්වය G වන යුග්මයක්ද ඉහත බල පද්ධතියට හඳුන්වා දෙන ලද්දේ නම්, F බලයේ විශාලත්වය හා දිශාව ද G යුග්මයේ විශාලත්වය හා දිශාව ද ලබා ගන්න.

- b). OXY අක්ෂ පද්ධතියට අනුබද්ධයෙන් බල පද්ධතියක් පහත දැක්වේ.


ලක්ෂ්‍යය	පිහිටුම් දෛශිකය	බලය
A	$-3\underline{i} + 4\underline{j}$	$F_1 = 5\underline{i} - \lambda\underline{j}$
B	$3\underline{i} - \underline{j}$	$F_2 = \underline{i} - 4\underline{j}$
C	$2\underline{i} - 2\underline{j}$	$F_3 = \mu\underline{i} + 6\underline{j}$
D	$-\underline{i} - \underline{j}$	$F_4 = -9\underline{i} + \underline{j}$

- මෙම පද්ධතිය බල යුග්මයකට තුල්‍ය වේ නම්, λ හා μ හි තාත්වික අගයන් සොයන්න.
 λ හා μ අගයයන් ගන්නා විට, F_1 මගින් දැක්වෙන බලය, පිහිටුම් දෛශිකය $-\underline{i}$ මගින් ලබා දෙනු ලබන E ලක්ෂ්‍යයෙහි ක්‍රියාකරයි නම්, බල පද්ධතියෙහි ස්වභාවය නිර්ණය කරන්න.
- $\lambda = \mu = 8$ වන විට, මූලින් දී ඇති බල පද්ධතිය, විශාලත්වය $5\sqrt{2}$ තනි බලයකට තුල්‍ය වන බව පෙන්වන්න. මෙම තනි බලයේ ක්‍රියා රේඛාවේ කාටීසියානු සමීකරණය සොයන්න.

12. a). AB සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක A හා B දෙකෙළවර එකම තිරස් මට්ටමේ වූ අවල ලක්ෂ්‍යය දෙකකට ඇඳා ඇති අතර තන්තුව මත වන C හා D ලක්ෂ්‍යය දෙකකදී පිළිවෙලින් බර w හා $2w$ වන අංශුන් දෙකක් ඇඳා ඇත. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී AC, CD හා DB තන්තු කොටස් උඩුඅත් සිරස සමඟ පිළිවෙලින් α, β හා θ කෝණ සාදන අතර, D ලක්ෂ්‍යය C හි මට්ටමට ඉහලින් පිහිටයි. C හා D හි ඇති අංශුන්ගේ සමතුලිතතාවය සලකා වෙන වෙනම ලාමි ප්‍රමේයය ලියා දක්වන්න. එනමින් $\sin \alpha \cdot \sin(\beta - \theta) = 2 \sin \theta \cdot \sin(\beta + \alpha)$ බව පෙන්වන්න.

- b). දිග $2l$ වූ සැහැල්ලු අවිතන්‍ය තන්තුවක එක් කෙළවරක් සිරස් තලයක සවිකර ඇති අරය $3l$ වූ සිහින් සුමට දෘඪ වෘත්තාකාර කම්බියක උච්චතම ලක්ෂ්‍යයට ඇඳා ඇත. කම්බිය දිගේ වලනය වීමට නිදහස ඇති බර w වූ කුඩා සුමට පබළුවක්, තන්තුවේ අනෙක් කෙළවරට ඇඳා ඇත. තන්තුව තදව, පබළුව සමතුලිතතාවයේ පවතින විට පබළුව මත ක්‍රියාකරන බල ලකුණු කර, ඒවා නිරූපණය වන බල ත්‍රිකෝණය අඳින්න.
එනමින් තන්තුවේ ආතතිය $\frac{2w}{3}$ බව පෙන්වා, පබළුව මත කම්බිය මගින් ඇති කරන බලයේ විශාලත්වය ද සොයන්න.


c). බර w හා දිග $2l$ වූ ඒකාකාර AB දණ්ඩක් තිරසර α ආනතව A කෙළවර සුමට තිරස් තලයක් මත තබා ඇති අතර අනෙක් කෙළවර තිරසර θ ආනත සුමට තලයක් හා ගැටෙමින් සමතුලිතව ඇත්තේ, රූපයේ දක්වා ඇති පරිදි දණ්ඩේ A කෙළවර හා ආනත තලයේ C ලක්ෂ්‍යයට සම්බන්ධ කළ සැහැල්ලු අභිතන්‍ය තන්තුවක් මගිනි. මෙහි AC තිරස් වේ. දණ්ඩ හා තලයේ වැඩිතම බෑවුම් රේඛාව එකම සිරස් තලයක වේ. සමතුලිත අවස්ථාවේ දණ්ඩ මත ක්‍රියා කරන සියලුම බල ලකුණු කරන්න.



තන්තුවේ ආතතිය $T = \frac{w \tan \theta}{2(1 + \tan \theta \tan \alpha)}$ බව ද,

තිරස් තලය මගින් දණ්ඩ මත ඇති කරන අභිලම්භ ප්‍රතික්‍රියාව $\frac{w}{2} \left[\frac{1 + 2 \tan \theta \tan \alpha}{1 + \tan \theta \tan \alpha} \right]$ බව ද, පෙන්වන්න.

“The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change.” — Carl Rogers



Visit SLGURU.LK to download papers and notes.