

වයඹ පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙවන වාර පරීක්ෂණය - 2020 - 12 ශ්‍රේණිය
රසායන විද්‍යාව I

(1) - 4	(11) - 3	(21) - 2	(31) - 2	(41) - 1
(2) - 1	(12) - 4	(22) - 4	(32) - 4	(42) - 4
(3) - 2	(13) - 1	(23) - 2	(33) - 3	(43) - 5
(4) - 5	(14) - 3	(24) - 4	(34) - 5	(44) - 5
(5) - 3	(15) - 1	(25) - 5	(35) - 5	(45) - 2
(6) - 1	(16) - 5	(26) - 3	(36) - 1	(46) - 4
(7) - 4	(17) - 3	(27) - 1	(37) - 4	(47) - 1
(8) - 2	(18) - 4	(28) - 2	(38) - 2	(48) - 3
(9) - 5	(19) - 5	(29) - 3	(39) - 1	(49) - 2
(10) - 3	(20) - 4	(30) - 1	(40) - 2	(50) - 3

රසායන විද්‍යාව II
A කොටස ව්‍යුහගත කොටස

(01) a. I. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න ආවර්තිතා වගුවේ තුන්වන ආවර්තයේ මූලද්‍රව්‍ය හා සම්බන්ධ වේ. කොටස් (i) සිට (v) දක්වා පිළිතුරු ලබා දීමේ දී ලබා දී ඇති අවකාශයේ මූලද්‍රව්‍යයේ සංකේතය ලියන්න.

i. අඩුම විද්‍යුත් සෘණතාව ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (උචිත වායුව නොසලකා හරින්න.)

..... Na

ii. ප්‍රමාණයෙන් කුඩාම ඒක පරමාණුක අයනය සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න. (මෙම අයනය ස්ථායී විය යුතුය.)

..... Al

iii. p ඉලෙක්ට්‍රෝන නොමැති නමුත් ස්ථායී වින්‍යාසයක් ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

..... Mg

iv. දෙවැනියට වැඩිම පළමු අයනීකරණ ශක්තිය ඇති මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

..... Cl


v. වායුමය අවස්ථාවේ දී ද්වි අවයවික වශයෙන් පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන උෟන සංයෝග සාදන මූලද්‍රව්‍ය හඳුනා ගන්න.

..... Al



$$@ 04 \times 5 = 20$$

(b) $CH_2NO_2^-$ අයනය සඳහා වඩාත්ම පිළිගත හැකි ලුවීස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය අඳින්න.

I. එහි සැකිල්ල පහත දක්වා ඇත.




II. H_3CN_2O අණුව සඳහා වඩාත්ම ස්ථායී ලුවීස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහය පහත දක්වා ඇත. මෙම අණුව සඳහා තවත් ලුවීස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහ (සම්ප්‍රයුක්ත ව්‍යුහ) දෙකක් අඳින්න. ඔබ විසින් අඳින ලද වඩාත් අස්ථායී ව්‍යුහය යටින් 'අස්ථායී' ලෙස ලියන්න.




අවසාන . (02)

III. පහත සඳහන් ලුට්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහය පදනම් කරගෙන වගුවේ ඇති C, N හා O පරමාණුවල,

- පරමාණුව වටා $VSEPR$ යුගල්
- පරමාණුව වට ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය
- පරමාණුව වටා හැඩය
- පරමාණුවේ මුහුම්කරණය සඳහන් කරන්න.
- පරමාණුවේ ඔක්සිකරණ අංකය සඳහන් කරන්න.



පහත දැක්වෙන පරිදි පරමාණු අංකනය කර ඇත.



	O^1	C^2	C^3	N^5
$VSEPR$ යුගල්	4	2	2	4
ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගල් ජ්‍යාමිතිය	තෙත්‍රාහිත	රේඛීය	රේඛීය	තෙත්‍රාහිත
හැඩය	තෙත්‍රාහිත	රේඛීය	රේඛීය	ත්‍රිකෝණීය
මුහුම්කරණය	sp^3	sp	sp	sp^3
ඔක්සිකරණ අංකය	-2	+1	0	+1

(එම $1 \times 20 = 20$)

IV. ඉහත (III) කොටසෙහි ලුට්ස් තීන් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් σ බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක / මුහුම් කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

- | | | | |
|------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| i. | $\text{H} - \text{O}^1$ | $\text{H} \dots 1s \dots$ | $\text{O}^1 \dots sp^3 \dots$ |
| ii. | $\text{O}^1 - \text{C}^2$ | $\text{O}^1 \dots sp^3 \dots$ | $\text{C}^2 \dots sp \dots$ |
| iii. | $\text{C}^2 - \text{C}^3$ | $\text{C}^2 \dots sp \dots$ | $\text{C}^3 \dots sp \dots$ |
| iv. | $\text{C}^3 - \text{C}^4$ | $\text{C}^3 \dots sp \dots$ | $\text{C}^4 \dots sp^2 \dots$ |
| v. | $\text{C}^4 - \text{N}^5$ | $\text{C}^4 \dots sp^2 \dots$ | $\text{N}^5 \dots sp^3 \dots$ |
| vi. | $\text{C}^4 - \text{O}$ | $\text{C}^4 \dots sp^2 \dots$ | $\text{O} \dots sp^2 \dots$ |

(එම $1 \times 12 = 12$)

- V. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි පහත සඳහන් π බන්ධන සෑදීමට සහභාගි වන පරමාණුක කාක්ෂික හඳුනාගන්න. (පරමාණුවල අංකනය (III) කොටසෙහි ආකාරයටම වේ.)

I. $C^2 - C^3$

C^2 ... 2. p ... භාග ...

C^3 ... 2. p ... භාග ...

II. $C^4 - O^6$

C^4 ... 2. p ... භාග ...

O^6 ... 2. p ... භාග ...

(ම : 01 x 4 = 4)

- VI. i. ඉහත (III) කොටසෙහි දෙන ලද ලුවීස් තිත් - ඉරි ව්‍යුහයෙහි ත්‍රිත්ව බන්ධනයේ π බන්ධන දෙක දිශානත වී ඇත්තේ කෙසේද?

..... (ම : 02)

- ii. එකිනෙකට වෙනස් පරමාණු 2 ක් අතර ත්‍රිත්ව බන්ධනයක් සහිත අණුවක් / අයනයක් සඳහා උදාහරණයක් දෙන්න.

..... HCN (ම : 02)

සැ.යු. ඔබේ උදාහරණයෙහි පරමාණු 3 කට වඩා අඩංගු නොවිය යුතුය.

ඔබ දෙන උදාහරණයේ ඇති මූලද්‍රව්‍ය ආවර්තිතා වගුවේ පළමුවන හා දෙවන ආවර්තවලට සීමා විය යුතුය.

- (c) i. පරමාණුක කාක්ෂිකයක් විස්තර කරනුයේ n, l සහ m_l ක්වොන්ටම් අංක තුන මගිනි. අදාළ ක්වොන්ටම් අංක සහ පරමාණුක කාක්ෂිකයේ නම පහත දැක්වෙන කොටුවල ලියන්න.

1. $\boxed{4} \quad \boxed{1} \quad -1 \quad 4p$

2. $4 \quad 2 \quad 0 \quad \boxed{4d}$

3. $\boxed{3} \quad \boxed{0} \quad \boxed{0} \quad 3s$ (ම : 01 x 6 = 6)

- ii. වරහන් තුළ දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවන පිළිවෙලට පහත සඳහන් දෑ සකසන්න. (හේතු අවශ්‍ය නොවේ.)

- I. $BeCO_3$, $MgCO_3$, $CaCO_3$ (වියෝජන උෂ්ණත්වය)

$BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3$

- II. N^+O_2 , NO_2 , NO_2^- ($O\dot{N}O$ බන්ධන කෝණය)

$NO_2^- < NO_2 < N^+O_2$

- III. C_2H_6 , C_2H_4 , C_2H_2 ($C-C$ බන්ධන දිග)

$C_2H_2 < C_2H_4 < C_2H_6$ (ම : 06 x 3 = 18)

(02) a. X යනු ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍යයකි. X හි පළමු දෙවැනි හා තුන්වැනි අයනීකරණ ශක්තීන් පිළිවෙලින් $kJ\ mol^{-1}$ වලින්, 519, 7300, 11800. $H_2(g)$ මුදා හරිමින් හා එහි හයිඩ්‍රොක්සයිඩය සාදමින් X ජලය සමඟ ප්‍රබල නොවන ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු කරයි. හයිඩ්‍රොක්සයිඩය භාස්මික වේ. X තනුක අම්ල සමඟ ප්‍රතික්‍රියාවේ දී $H_2(g)$ මුදා හැරේ. X වාතයේ දහනය වී සහ සංයෝග දෙකක මිශ්‍රණයක් ලබා දේ. එම සංයෝග දෙක ජලයට එක් කළ විට Y නැමැති භාස්මික වායුවක් පිටවේ.

i. X හඳුනාගන්න.

Li (ඉ: 07)

ii. X හි භූමි අවස්ථාවේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික වින්‍යාසය ලියන්න.

$1s^2 2s^1$ (ඉ: 04)

iii. X වාතයේ දහනයේ දී සෑදෙන සංයෝග දෙකෙහි රසායනික සූත්‍ර ලියන්න.

Li_2O (ඉ: 03) හා Li_3N (ඉ: 03)

iv. s ගොණුවේ X අයත්වන කාණ්ඩය හැරුණු විට අනෙක් කාණ්ඩයෙහි මූලද්‍රව්‍යයන්හි දී ඇති සංයෝග සලකන්න. කාණ්ඩයේ පහළට යාමේ දී දක්වා ඇති ගුණය වැඩිවේ ද අඩුවේ ද යන්න දී ඇති කොටු තුළ සඳහන් කරන්න.

1. සල්ෆයිටවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය

අඩුවේ (ඉ: 03)

2. හයිඩ්‍රොක්සයිඩවල ජලයේ ද්‍රාව්‍යතාවය

වැඩිවේ (ඉ: 03)

3. ලෝහ නයිට්‍රේටවල තාප ස්ථායීතාවය

වැඩිවේ (ඉ: 03)

3 හි ඔබගේ පිළිතුරු හේතුව දක්වන්න.

කාබොනේට්, සූර්ය කාණ්ඩයට පැවතීම වැඩිවේ. (ඉ: 03)
ඔක්සිජන් බලය අඩුවේ. (ඉ: 02)
දායකයන් ලෙසින් අඩුවේ නැවත ස්ථායීතාව වැඩිවේ. (ඉ: 03) } 08

v. $H_2(g)$, $O_2(g)$ හා $N_2(g)$ සමඟ X ට බොහෝ දුරට සමාන ලෙස ප්‍රතික්‍රියා කරන නමුත් X අඩංගු කාණ්ඩයට අයත් නොවන ආවර්තිතා වගුවේ s - ගොණුවේ මූලද්‍රව්‍ය හඳුනාගන්න.

Mg (ඉ: 04)

vi. ඉහත Y නැමැති භාස්මික වායුව කුමක්ද?

NH_3 (ඉ: 04)

vi. Y හඳුනා ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණයක් දෙන්න.

වැයුම ගන්න. රතු වර්ණයක් ගන්නා, යම්කිසි ගෑස් කාබන් නිවැරදි වීලෝම (ඉ: 04)

viii එම පරීක්ෂණයේ නිරීක්ෂණය කුමක්ද?

රතු වර්ණය නිවැරදි වේ. (ඉ: 04)
ගෑස් අඩු නිවැරදි නිරීක්ෂණය.

ඉහත (i) සිට (vi) දක්වා ලබා ලබාදීමට (i) නිවැරදි විය යුතුය.
 ඉහත (vi) සිට (viii) දක්වා 5 ලබා ලබාදීමට (vi) නිවැරදි විය යුතුය.


- (b) A සිට E දක්වා නම් කර ඇති පරීක්ෂණ තල වල Na_2SO_4 , Na_2SO_3 , NaOH , K_2CrO_4 හා $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ හි (පිළිවෙලින් නොවේ) ජලීය ද්‍රාවණ අඩංගු වේ. A සිට E දක්වා ඇති එක් එක් පරීක්ෂණ තලයට අදාළ පරීක්ෂණය හා අදාළ නිරීක්ෂණ පහත දී ඇත.

පරීක්ෂණ තලය	පරීක්ෂණය	නිරීක්ෂණය
A	BaCl_2 ද්‍රාවණ ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න. ඉන්පසු තනුක HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබී පසුව එය දියවේ.
B	$\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ ද්‍රාවණය එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
C	BaCl_2 ද්‍රාවණ 1 cm^3 පමණ එකතු කරන්න. ඉන්පසු ත. HCl එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් සෑදේ. එය දිය නොවේ.
D	Na_2CO_3 1 cm^3 ක් පමණ එකතු කරන්න.	සුදු පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.
E	BaCl_2 ද්‍රාවණ 1 cm^3 එකතු කරන්න.	කහ පැහැති අවක්ෂේපයක් ලැබේ.

- (i) A සිට E දක්වා පරීක්ෂණ තල වල ද්‍රාවණ හඳුනාගන්න.

A Na_2SO_3 B NaOH
 C Na_2SO_4 D $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$
 E K_2CrO_4 (එ.ස.ය = 25)

- (ii) A, B, C, D හා E පරීක්ෂණ තල වල සිදුවන ප්‍රතික්‍රියා සඳහා තුලිත රසායනික / අයනික සමීකරණය ලියන්න.



- (03) (a) I. විද්‍යාගාරයේ දී 1 mol dm^{-3} Na_2CO_3 ද්‍රාවණ 250 cm^3 සෑදීම සඳහා සහ $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ සපයා ඇත. (Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1)

- i. අවශ්‍ය කරන Na_2CO_3 mol ගණන කොපමණද?

$$n = C \cdot V$$

$$= 1 \text{ mol dm}^{-3} \times 250 \times 10^{-3} \text{ dm}^3$$

$$= 0.25 \text{ mol} \quad (\text{එ.ස.ය} = 10)$$

- ii කිරාගත යුතු $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ස්කන්ධය කොපමණද?

$$M_r(\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}) = (23 \times 2) + 12 + (16 \times 3) + (5 \times 18) = 196$$

$$m = n \cdot M_r = 0.25 \text{ mol} \times 196 \text{ g mol}^{-1}$$

$$m = 49 \text{ g}$$

$$(7 \times 2 = 14 \text{ අංකයක් වශයෙන් } 1) = (\text{එ.ස.ය} = 15)$$

iii. ප්‍රමාණික ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

භාග්‍යවත් ද්‍රාවණ සාන්ද්‍රණයක් සහිත ද්‍රාවණ. (ඉ. 05)

iv. ප්‍රාථමික සම්මත ද්‍රාවණයක් යනු කුමක්ද?

ප්‍රාමාණික ද්‍රාවණ විලියෙහි නිර්වේදී සහ අන්යයන් සමඟ, ක්‍රියාත්මක, සාපේක්ෂව නොවන, ඉහත අනුමාන කළ ක්‍රියාත්මක හා ඉහත ජල ද්‍රාවණයන් අතින් ප්‍රාග්ධන කළ නොහැකි ප්‍රමාණික සන්තති ද්‍රාවණයක් ලෙස හඳුන්වයි. (ඉ. 15)

v. ප්‍රාථමික සම්මත සඳහා උදාහරණ 02 ක් දෙන්න.

Na_2CO_3 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, KSCN

ඔනෑම 2 ක් (ඉ. 05 x 2 = 10)

vi. NaOH හි නිවැරදි සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් සම්මත ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කර ගත නොහැක්කේ මන්ද?

CO_2 දියවීමේදී ආස්‍රාදයක් නිසා වැරදි වේ.

(ඉ. 10)

vii. ඉහත සාදන ලද $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය කුඩා ප්‍රමාණයකින් වෙනස් විය හැක. එයට හේතු 2 ක් දෙන්න.

• $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ සංයුක්ත නොවීම.

• බඳි ඇති ජල අණු ප්‍රාග්ධන නොවීම. (ඉ. 05 x 2 = 10)

viii. දන්නා සාන්ද්‍රණයෙන් යුත් ද්‍රාවණයක් පිළියෙල කිරීමට භාවිතා කරන විදුරු උපකරණය කුමක්ද?

පරිමාණික රළුකඩ. (ඉ. 10)

ix. ඉහත $1 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ ද්‍රාවණය භාවිතා කර $0.25 \text{ mol dm}^{-3} \text{Na}_2\text{CO}_3$ 100 cm^3 ක් සාදා ගැනීම සඳහා එම ද්‍රාවණයෙන් ලබා ගත යුතු පරිමාව ගණනය කරන්න.

$$C_1 V_1 = C_2 V_2 \quad (\text{ඉ. 05})$$

$$1 \text{ mol dm}^{-3} \times V = 0.25 \text{ mol dm}^{-3} \times 100 \text{ cm}^3 \quad (\text{ඉ. 4+1})$$

$$V = 25 \text{ cm}^3 \quad \text{ඉ. (04+1)}$$

★ බහාලන රටා සහිත සාදන ද්‍රාවණයක් සාදනු ලබන බව.

- (04) කිසියම් සංයෝගයක ස්කන්ධය අනුව 30.46% ක් නයිට්‍රජන් ද, 69.54% ඔක්සිජන් ද වේ. සංයෝගයේ සාපේක්ෂ අණුක ස්කන්ධය 90 - 95 අතර වේ.

i. සංයෝගයේ ආනුභවික සූත්‍රය සොයන්න. ($N = 14, O = 16$)

	N	O	
	30.46%	69.54%	
ස්කන්ධය	30.46 g	69.54 g	ආනුභවික
$n = \frac{m}{M}$	$\frac{30.46 \text{ g}}{14 \text{ g mol}^{-1}}$	$\frac{69.54 \text{ g}}{16 \text{ g mol}^{-1}}$	ප්‍රමාණය = NO_2
	2.17 mol	4.34 mol	

ii. සංයෝගයේ අණුක සූත්‍රය සොයන්න.

(ආනුභවික ප්‍රමාණය $\times n$) = සා. අණු ✓
 $[14 + (16 \times 2)]n = 90 - 95$ ✓

$$46n = 90 - 95$$

$$n = \frac{90 - 95}{46} = 2 \quad \checkmark$$

$$\therefore \text{අණුක ප්‍රමාණය} = NO_2 \times 2 = N_2O_4 \quad \checkmark$$

iii. සංයෝගයේ නිවැරදි මවුලික ස්කන්ධය කොපමණද? ($N = 14, O = 16$)

$$N_2O_4 = ((14 \times 2) + (16 \times 4)) \text{ g mol}^{-1} \quad \checkmark$$

$$= 92 \text{ g mol}^{-1} \quad \checkmark$$

$$(\text{e.g.: } O_2 \times 16 = 32)$$

(b) I. $KMnO_4$ වර්ණවත් සංයෝගයකි.

i. $KMnO_4$ හි IUPAC නාමය ලියන්න,

.....potassium permanganate..... (e: 05)

ii. $KMnO_4$ තුළ Mn හි ඔක්සිකරණ අංකයෙන් ව්‍යුත්පන්න වන ඔක්සයිඩයේ රසායනික සූත්‍රය ලියන්න.

..... MnO (e: 05)

- ii. 298 K දී ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්වයංසිද්ධතාව පැහැදිලි කරන්න.

$\Delta G^\circ = +$ හේ නිසා ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධ නොවේ. (0.05)

- iii. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවීම සඳහා අවශ්‍ය කරන අවම උෂ්ණත්වය ගණනය කරන්න.

ස්වයංසිද්ධතාව $\Delta G < 0$ හේ. (0.03)

$$\Delta H - T \Delta S < 0 \quad (0.03)$$

$$\Delta H < T \Delta S$$

$$\frac{\Delta H}{\Delta S} < T \quad (0.03)$$

$$\frac{90 \text{ kJ mol}^{-1}}{0.25 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}} < T \quad (0.02 + 1)$$

$$\underline{\underline{360 \text{ K} < T}} \quad (0.03)$$

රජ්‍යයන් විද්‍යාව. - 2020.

12-සැප්තැම්බර් - II වාර්ශය.

ඊටරා - පිළිතුරු.

5) (a). (i). A බලනව, $pV = nRT$ යෙදවීම. ✓

$$1.6 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n_A \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}$$

$$\text{NH}_3 \text{ මවුල (} n_A \text{)} = 0.2 \text{ mol} \quad \checkmark$$

B බලනව,

$$2.4 \times 10^5 \text{ N m}^{-2} \times 8.314 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n_B \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}$$

$$\text{Cl}_2 \text{ මවුල (} n_B \text{)} = 0.6 \text{ mol.} \quad \checkmark$$

(ලකුණු $3 \times 5 = 15$)

(ii). I. $\text{NH}_3 (\text{g}) + 3 \text{Cl}_2 (\text{g}) \rightarrow \text{NCl}_3 (\text{l}) + 3 \text{HCl} (\text{g})$.

ආරම්භක මවුල 0.2 0.6

අවසාන මවුල - - 0.2 ✓ 0.6 ✓

බලන්න මවුල මුළු ආශ්‍රිත සංඛ්‍යාව = 0.8 mol

(ලකුණු $3 \times 3 = 15$).

II. අවසාන පද්ධතියට $pV = nRT$

$$p \times 12.471 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 0.8 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}$$

$$p = 2.13 \times 10^5 \text{ Pa.} \quad \checkmark$$

(ලකුණු 20).

III. පද්ධතියේ මවුල $\text{Cl}_2 (\text{g})$ හා $\text{NH}_3 (\text{g})$ සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්‍රියා වී අවසන් වූ ඇත. $\text{NH}_3 (\text{g})$ මතානු තැපි වීම හේතු $\text{Cl}_2 (\text{g})$ හෙපරිත වැඩි ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවේ. නමුත් $\text{NH}_3 (\text{g})$ 0.4 mol ක් මතානු තැපිව මගින් මුළු පද්ධතියේ පීඩනය, මුළු පද්ධතියට මතානු වේ. $\therefore$ මුළු පීඩනය වැඩිවේ.

(ලකුණු 10).


IV. පද්ධතියට, $pV = nRT$

$$p \times 12.471 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = 1.2 \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K}$$


(e. 8).

$$p = 3.2 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}. \quad \checkmark \quad (\text{e. 7}).$$

(b). (i).



(ලකුණු 20).



(iii).
$$P_{\text{H}_2} = P_T - P_{\text{H}_2\text{O}}$$

$$= 1.013 \times 10^5 \text{ Pa} - 0.036 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$= \underline{\underline{0.977 \times 10^5 \text{ Pa}}}$$
 ✓

$\text{H}_2 \text{ (g)} \text{ ට } PV = nRT$

$$0.977 \times 10^5 \text{ Pa} \times 50 \times 10^{-6} \text{ m}^3 = n \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K}$$
 ✓

$$n = 0.002 \text{ mol.} \quad (\text{0.0019}).$$

Mg : H_2 ඔවුල ප්‍රමාණය,

1 : 1 බැවින්,

$$\text{Mg ඔවුල} = 0.002 \text{ mol} \quad \checkmark$$

$$\text{Mg ඔවුල} = \frac{\text{Mg ප්‍රමාණය}}{\text{Mg කා.ප.ම.}}$$

$$0.002 \text{ mol} = \frac{0.05 \text{ g}}{\text{Mg කා.ප.ම.}}$$

$$\therefore \text{Mg කා.ප.ම.} = 25 \quad \checkmark \quad (\text{ලකුණු } 5 \times 5 = 25)$$

(iv) H_2 වායුව පරිශුද්ධ ලෙස ලබා දෙන ලෙස. (උ. 5).

For Educational Purpose Only

ලකුණු 55

(i). (ii). වෙනස්වන.

* අංශු වල සාපේක්ෂ චලිතය පරිමාණය වන අතර අංශු
විෂ්ලේෂණය වලට සාපේක්ෂව වෙනස් වේ.

* වායු අංශු චලිතයේ සමස්ත චාලක ශක්තිය
විෂ්ලේෂණය වන අතර සමස්ත චාලක ශක්තිය
වායු අංශු වලට බෙදා හරිනු ලැබේ.

* වායු අංශු චලිතයේ සමස්ත චාලක ශක්තිය
විෂ්ලේෂණය වන අතර සමස්ත චාලක ශක්තිය
වායු අංශු වලට බෙදා හරිනු ලැබේ.

* වායු අංශු අතර චාලක ශක්තිය බෙදා හරිනු ලැබේ.

* වායු අංශු අතර චාලක ශක්තිය බෙදා හරිනු ලැබේ.
සමස්ත චාලක ශක්තිය බෙදා හරිනු ලැබේ.
(ලකුණු 2x5=10).

(ii). $PV = \frac{1}{3} n N C^2$ (ලකුණු 05)

P = පීඩනය.

V = වායුවේ පරිමාව.

n = වායු අංශුවල / අංශුවල සංඛ්‍යාව.



N = මුළු වායු අංශු / අංශු සංඛ්‍යාව.

C^2 = වර්ග චාලක ශක්තිය.

(ලකුණු 05)





ලකුණු 20

6. (a).



(ලකුණු 5x5 = 25).

ලකුණු 25



අංශු 2x3 = 06
මූලික වස්තු 2x2 = 04

මෙම නියමය ඔප්පුකර,

$$\Delta H_f^\ominus + 4 \times 460 \text{ kJmol}^{-1} = 2 \times 432 \text{ kJmol}^{-1} + 494 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$\Delta H_f^\ominus + 1840 = 864 + 494$$

$$\Delta H_f^\ominus = 1358 - 1840$$

$$\Delta H_f^\ominus = -482 \text{ kJmol}^{-1}$$

විකල්ප විවිකුණ.

ලකුණු 5x2 = 10.

$$\Delta H_f^\ominus = \sum \Delta H_D^\ominus (\text{ප්‍රතිච්ඡේද}) - \sum \Delta H_D^\ominus (\text{ප්‍රතිච්ඡේද})$$

$$= 2 \times 432 \text{ kJmol}^{-1} + 494 \text{ kJmol}^{-1} - 4 \times 460 \text{ kJmol}^{-1}$$

$$= 864 + 494 - 1840$$

$$= -482 \text{ kJmol}^{-1}$$

(ලකුණු 4x5 = 20)

3. SLGURU.LK

For Educational Purpose Only

(ii) $\Delta S_r^\ominus = S_{\text{ප්‍රතිඵල}}^\ominus - S_{\text{ප්‍රතික්‍රියා}}^\ominus$ ✓

$$= 2 \times 188.8 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} - \{2 \times 130.7 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1} + 205.1 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}\}$$

$$= 377.6 - \{261.4 + 205.1\}$$

$$= 377.6 - 466.5$$

$$= \underline{-88.9 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}} \quad (\text{ලකුණ } 4 \times 5 = 20)$$

(iii) $\Delta G_r^\ominus = \Delta H_r^\ominus - T \Delta S_r^\ominus$ ✓

$$= -482 \text{ kJ mol}^{-1} - 298 \text{ K} \times (-88.9 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1})$$

$$= -482 \text{ kJ mol}^{-1} + 26492.2 \text{ J mol}^{-1}$$


$$= (-482 + 26.49) \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$= \underline{-455.51 \text{ kJ mol}^{-1}} \quad (\text{ලකුණ } 2 \times 5 = 10)$$

$\Delta G_r^\ominus < 0$ බැවින්,

ප්‍රතික්‍රියාව ස්වයංසිද්ධව සිදුවේ. (ලකුණ 05)

(c).




$$\Delta H_r^\ominus + 2 \times (-349 \text{ kJ mol}^{-1}) + 1451 \text{ kJ mol}^{-1} + 738 \text{ kJ mol}^{-1} + 244 \text{ kJ mol}^{-1} + 148 \text{ kJ mol}^{-1} = -641 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta H_r^\ominus = -2524 \text{ kJ mol}^{-1} \quad (\text{ලකුණ } 5 \times 2 = 10)$$

$$\Delta H_r^\ominus = \underline{-2524 \text{ kJ mol}^{-1}} \quad (\text{ලකුණ } 70)$$

(*) (a)



(ii). $Q = mc \Delta T$ ✓

(ලකුණු 4)

$$= 250 \text{ cm}^3 \times 1 \text{ g cm}^{-3} \times 4.2 \text{ J K}^{-1} \text{ g}^{-1} \times (313 - 300) \text{ K}$$

$$= 13650 \text{ J}$$

$$= \underline{13.65 \text{ KJ}} \cdot \checkmark$$

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$).

(iii). දියවූ HNO_3 මවුල = $\frac{2 \times 125}{1000}$

$$= 0.25 \text{ mol} \quad \checkmark$$

HNO_3 0.25 mol මගින් විවෘත කාර්ය = 13.65 KJ

HNO_3 1 mol ක් මගින් විවෘත කාර්ය = $\frac{13.65 \text{ KJ}}{0.25 \text{ mol}} \quad \checkmark$


$$= 54.6 \text{ KJ mol}^{-1}$$

$\therefore$ පමුණු ප්‍රතික්ෂේපණ ගණකාලය = $\underline{-54.6 \text{ KJ mol}^{-1}} \quad \checkmark$
(ලකුණු $5 \times 3 = 15$)


(iv) 1. ප්‍රතික්‍රියාවේ මූලාශ්‍රිත කාර්ය මුළුමනින්ම ප්‍රාභූය වීමේදී ලියා ගන්නා බව (ප්‍රදායවත් ආජාතය තවදුරටත් බව හා ආව පරිසරයට කාර්ය අපහේ කෙරෙන බව) ✓

2. අවසන් ප්‍රාභූයේ ස්ථායීතාවය, ජලයේ ස්ථායීතාවයට පමණ යැයි ද ප්‍රාභූයේ ච.ත.බා. ජලයේ ච.ත.බා.ව බවට යැයි ද පැවසීම. ✓ (ලකුණු $5 \times 2 = 10$)

(v). මෙලෙස පමුණු අගයයන් වෙනස් වීමට හේතු වනුයේ අම්ලය සහ පාෂණය ප්‍රතික්‍රියාවෙන් විවෘත කාර්යයන් කෙරෙහි ප්‍රදායවත් ආජාතයට හා පරිසරයට ප්‍රචාරය වීමයි. (ලකුණු 5)





අවිච්ඡින්න ප්‍රභව අම්ලයක් බවින්, ප්‍රතික්‍රියාවේ දී විවෘත කාර්යයන් කෙරෙහි ප්‍රති විච්ඡින්න බලයක් ලෙස ගත්කොට පමුණු ප්‍රතික්ෂේපණ ගණකාලය -57 KJ mol^{-1} වන අයුරු අගයයන් ගත්කොට. ✓



මෙහි දී $\text{H}_2\text{O (l)}$ අ මවුල 2 ක් සෑදීමත් $\text{BaSO}_4 \text{ (s)}$ මවුල 1 ක් සෑදීමත් සම්මත පමුණු ප්‍රතික්ෂේපණ ගණකාලය -114 KJ mol^{-1} වන බැවින් අගයයන් ගත්කොට. (ලකුණු $2 \times 8 = 16$)

ලකුණු 65



(ii). වැයවූ KMnO_4 මවුල = $\frac{0.015 \times 30}{1000}$ ✓ (ප්‍රශ්න 10x2=20)

= $4.5 \times 10^{-4} \text{ mol}$ ✓

∴ ප්‍රතිචක්‍ර 25 ලීටර් NO_2^- මවුල = $\frac{4.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 5}{2}$ ✓

= $11.25 \times 10^{-4} \text{ mol}$

ප්‍රතිචක්‍ර 250 ලීටර් NO_2^- මවුල = $\frac{11.25 \times 10^{-4} \text{ mol} \times 250}{25}$ ✓

= $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓

∴ KNO_2 මවුල = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓

විඛේපනය වූ KNO_3 මවුල = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ✓


∴ විඛේපනය වූ KNO_3 බර = $11.25 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 101 \text{ g mol}^{-1}$ ✓

= 1.13 g ✓

මුළු වැයවූ KNO_3 බර = $1.55 \text{ g} - 1.13 \text{ g}$

= 0.42 g ✓


(ප්‍රශ්න 3x10=30)



(ප්‍රශ්න 10)








(ප්‍රශ්න 10)



(ප්‍රශ්න 15).

ප්‍රශ්න 3.5

8) (a)



(එකතුව 10x5 = 50)

එකතුව 50



(b) (i) (a) Ba^{2+} හෝ Sr^{2+} අයන වේ. (එකතුව 10)

(ii) වායුව NO_2 වන අතර
එහෙය $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ හෝ $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ විය හැක.

(iii) පහත සිහිපත්කරන ලද කොටසකින්
දැනට ලබාදෙනුයේ Ba^{2+} අයන වේ.



(එකතුව 5x6 = 30)

(iv) එහෙය - $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$. (එකතුව 10)



(එකතුව 10x2 = 20)

එකතුව 60



$\text{KNO}_3 \text{ මවුල} = x \text{ mol}$

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \text{ මවුල} = y \text{ mol}$

$101x + 164y = 2.84 \quad \text{--- (1) ✓}$

$85x + 56y = 1.98 \quad \text{--- (2) ✓}$

$(1) \times 85 - (2) \times 101,$

(ලකුණ $4 \times 2 = 8$)

$8284y = 41.42$

$y = 0.005 \text{ mol} \quad \checkmark$

$\therefore \text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \text{ ස්කන්ධය} = 0.005 \text{ mol} \times 164 \text{ g mol}^{-1}$
 $= \underline{0.82 \text{ g}} \quad \checkmark$

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \text{ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය} = \frac{0.82 \text{ g}}{2.84 \text{ g}} \times 100\% \quad \checkmark$
 $= \underline{28.87\%} \quad \checkmark$

$\therefore \text{KNO}_3 \text{ ස්කන්ධ ප්‍රතිශතය} = 100 - 28.87$
 $= \underline{71.13\%} \quad \checkmark$

(ලකුණ $3 \times 6 = 18$)

(ii) ප්‍රියුර් හතැන් වායුවක් ජවාව. (ලකුණ 8).

ලකුණ 40

(09)

(a) (i) $Be(NO_3)_2$ $Mg(NO_3)_2$ $Ca(NO_3)_2$

Be^{2+} NO_3^- Mg^{2+} NO_3^- Ca^{2+} NO_3^-

මෙහි ඇතැයුනු හොඳ වේ. (NO_3^-) ✓

කැටායන වල අර්ධ,

$Be^{2+} < Mg^{2+} < Ca^{2+}$ ✓

∴ ඔප්පුකරණය වල,

$Be^{2+} > Mg^{2+} > Ca^{2+}$ ✓

සාපේක්ෂ ලක්ෂණ $BeCO_3 > MgCO_3 > CaCO_3$ ✓

අයනික ලක්ෂණ $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3$

∴ තව වෙනස්කිරීම $BeCO_3 < MgCO_3 < CaCO_3$ ✓

(ii) $NaOH$ KOH $Mg(OH)_2$

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$)

මෙහි OH^- ඇතැයුනු හොඳ වේ. ✓

∴ කැටායන අර්ධ. $Mg^{2+} < Na^+ < K^+$ ✓

ඔප්පුකරණය වල $Mg^{2+} > Na^+ > K^+$ ✓

∴ සාපේක්ෂ ලක්ෂණ $Mg(OH)_2 > NaOH > KOH$

අයනික ලක්ෂණ $Mg(OH)_2 < NaOH < KOH$ ✓

OH^- බැහැර කිරීමේ ශක්තිය, (නැවැත්වීම)


$Mg(OH)_2 < NaOH < KOH$ ✓

* විද්‍යුත් භාෂණ අගයයන් පදනම් කරගත්විස
විවිධ ජලීය ලෝහයන්.

(ලකුණු $2 \times 5 = 10$)


(iii)	PF_3	PCl_3	PI_3
විද්‍යුත් භාෂණය	sp^3	sp^3	sp^3 ✓
පරමාණුක අර්ධ	0	0	0 ✓
ව. අංකය	+3	+3	+3 ✓

∴ P වල විද්‍යුත් භාෂණය සංසන්දනය කළ
නැවැත්වීමේ P වල බලය අනුව පරමාණු වල විද්‍යුත්
භාෂණය විද්‍යුත් භාෂණය $F > Cl > Br$ ලෙස වෙනස්



(iv) H_2O ని కాడివిరియన లక్షణాలు ఉన్నాయి.

H_2S හා H_2O හි දියවීමේ දියුණු බව දැක්වේ. දියවීමේ
 දියුණු බව වලට පෙනේ. නමුත් H_2S වල වඩා H_2O හි
 වඩා දියවීමේ ප්‍රතික්‍රියාවක් H_2O හි දියවීමේ.
 දියවීමේ දියුණු බව H_2S වල වඩා දියවීමේ. H_2S හා
 H_2O හි පෙනේ. දියවීමේ දියුණු බව වලට
 වඩා H_2O හි ප්‍රතික්‍රියාවක් වශයෙන් පෙන්වා දීම
 වායුවේ දියවීමේ දියුණු බව. $\therefore$ පෙනේ.



(b) (i).

	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$	$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	$\text{BaCl}_2(\text{aq})$	$\text{NaNO}_3(\text{s})$
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$	-	-	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ ppt	-
$\text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$	-	-	$\text{BaSO}_4(\text{s})$ ppt	-
$\text{BaCl}_2(\text{aq})$	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ ppt	$\text{BaSO}_4(\text{s})$ ppt	-	-
$\text{NaNO}_3(\text{aq})$	-	-	-	-

(ප්‍රශ්න 10)

[illegible]

(e.g. $2 \times 7 = 14$)



	$\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{aq})$	$\text{MgCl}_2(\text{aq})$	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$	$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$
$\text{Na}_2\text{CrO}_4(\text{aq})$	-	-	$\text{BaCrO}_4(\text{s})$ precipitate	-
$\text{MgCl}_2(\text{aq})$	-	-	-	$\text{MgCO}_3(\text{s})$ precipitate
$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2(\text{aq})$	$\text{BaCrO}_4(\text{s})$ precipitate	-	-	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ precipitate
$\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{aq})$	-	$\text{MgCO}_3(\text{s})$ precipitate	$\text{BaCO}_3(\text{s})$ precipitate	-

(உதாரணம் $2.5 \times 4 = 10$)

චන්ද්‍රිකා පරිදි ප්‍රධාන සුරාල් වශයෙන් ඔප්පු කිරීමේ දී
 කාන්තා වාට් ප්‍රාග්ධනවලින් පමණක් ලැබෙන බව පෙන්වා දෙන
 ප්‍රධාන Na_2CO_3 වේ. සුදු පැහැති ප්‍රාග්ධනවලින්
 පමණක් ලැබෙන MgCl_2 වේ. ඔප්පු කිරීමේ දී
 සුදු ප්‍රාග්ධන 2 ක් ලැබෙන බව පෙන්වා දෙන ප්‍රාග්ධන
 Na_2CO_3 වා ප්‍රාග්ධන සුදු පැහැති වා කාන්තා පැහැති
 ලෙස ප්‍රාග්ධන ප්‍රාග්ධන ලැබෙන $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ වේ
 පෙන්වා දෙන බව දී ව.

(ලකුණු 2x9=18)

(ලකුණු $2 \times 9 = 18$).

[illegible]

(உதாரணம் $4 \times 6 = 24$).


১৯৮৬ ৭৬

- (c). (i). NaHCO_3 - Sodium hydrogen Carbonate. ✓
 (ii). CuSO_4 - Copper(II) sulfate. ✓
 (iii). CuCl - Copper(I) chloride. ✓
 (iv). $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ - iron(III) sulfate. ✓
 (v). KMnO_4 - potassium permanganate. ✓

(ලකුණු $5 \times 5 = 25$).

(10). (a).

(i) XeF_4



ඔබේ පරමාණුව වඩා මුළු ඒකමණ්ඩල ගණන = 6. ✓

VSEPR යුගල = 6. ✓


ඉවත් කරන = 4

වෙනස් යුගල = 2. } (ලකුණු $2 \times 3 = 6$)

∴ හැඩය හරි තර්කය පවතින්නේ නම්.

(ලකුණු 4).

(ii). PF_5



P වා මුළු ඒකමණ්ඩල ගණන = 5


VSEPR යුගල = 5

ඉවත් කරන = 5

වෙනස් යුගල = 0

∴ හැඩය ත්‍රිකෝණීය ද්විතීයිකය.

(iii). NCl_3



N වා මුළු ඒකමණ්ඩල ගණන = 4


VSEPR යුගල = 4

ඉවත් කරන = 4

වෙනස් යුගල = 0

∴ හැඩය ත්‍රිකෝණීය පිරව්වකි.

(iv). ClO_4^-




Cl වා මුළු ඒකමණ්ඩල ගණන = 7

VSEPR යුගල = 4

ඉවත් කරන = 4

වෙනස් යුගල = 0

∴ හැඩය චතුරස්‍රාකාරය.



N වා මුළු ඒකමණ්ඩල ගණන = 4

VSEPR යුගල = 3 (ලකුණු 10×5)

ඉවත් කරන = 3

වෙනස් යුගල = 0

SLGURU.LK

මුළු ලකුණු 50

For Educational Purpose Only

(b). Cr_2O_3 මවුල $= \frac{1.52\text{g}}{152\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.01\text{mol}$ ✓
 H_2O මවුල $= \frac{0.72\text{g}}{18\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.04\text{mol}$ ✓
 N_2 මවුල $= \frac{0.28\text{g}}{28\text{g mol}^{-1}}$
 $= 0.01\text{mol}$ ✓


$\text{Cr}_2\text{O}_3 : \text{H}_2\text{O} : \text{N}_2$ මවුල අනුපාතය,
 $0.01 : 0.04 : 0.01$

$1 : 4 : 1$ ✓


අනුපාතය, $\text{Cr} : \text{H} : \text{N} : \text{O}$ පරමාණු මවුල
 $2 : 8 : 2 : 7$

∴ අනුමානිත ප්‍රත්‍යය. $\text{Cr}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_7$. ✓ (ලකුණු 4×5=20)

x හි අනුමාන ප්‍රත්‍යය. $\text{Cr}_2\text{H}_8\text{N}_2\text{O}_7$



(ලකුණු 10).



$\text{KMnO}_4 : \text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ මවුල අනුපාතය, (ලකුණු 15).

$2 : 5$ ✓

ප්‍රතිචක්‍රය 25 cm³ හි අනුමානිතය වැඩි

$\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ මවුල $= \frac{0.02 \times 15}{1000}$ ✓

∴ ප්‍රතිචක්‍ර 25 cm³ තුළ KMnO_4 මවුල $= \frac{3 \times 10^{-4} \text{mol}}{5} \times 2$ ✓
 $= 1.2 \times 10^{-4} \text{mol}$ ✓


ප්‍රතිචක්‍ර 100 cm³ තුළ KMnO_4 මවුල $= \frac{1.2 \times 10^{-4} \text{mol} \times 100 \text{cm}^3}{25 \text{cm}^3}$
 $= 4.8 \times 10^{-4} \text{mol}$ ✓

∴ නිශ්පාදනය තුළ ඇති KMnO_4 වර්තමානය,
 $= 4.8 \times 10^{-4} \text{mol} \times 158 \text{g mol}^{-1}$ ✓
 $= 0.07584 \text{g}$
 $= 75.84 \text{mg}$ ✓

KMnO_4 හි වර්තමාන ප්‍රතිශතය $= \frac{75.84 \text{mg}}{200 \text{mg}} \times 100\%$ ✓
 $= 37.92\%$ ✓

(ලකුණු 5×12=55)

“Education is simply the soul of a society as it passes from one generation to another.” – G.K. Chesterton



Visit SLGURU.LK to download papers and notes.